



PREGUNTE SOBRE LOS OPIOIDES

“¿Qué más hay
para el dolor después
de la cirugía además
de los opioides?”

HAY UNA RESPUESTA

No se recomienda el uso de EXPAREL en pacientes menores de 6 años o en embarazadas.

NON-OPIOID
EXPAREL®
(bupivacaine liposome injectable suspension)

USTED TIENE DERECHO A OPINAR SOBRE EL MANEJO DE SU DOLOR

“ ¿Hay
alternativas a los
opioides? ”

Antes de someterse a una
cirugía, asegúrese de analizar
sus preferencias y opciones
para el manejo del dolor con
su médico.



HAGA UN PLAN DE MANEJO DEL DOLOR CON SU MÉDICO ANTES DE LA CIRUGÍA

Su plan se basará en el tipo de cirugía que se le realice, la zona del cuerpo donde se realizará la cirugía, cuánto dolor puede manejar, su tolerancia a los analgésicos, su salud general y cómo el dolor puede afectar a su recuperación.

Por ejemplo:

- Las mujeres experimentan dolor de forma diferente a los hombres
- Los efectos secundarios de algunos analgésicos pueden retrasar la recuperación más de lo que usted espera
- ¿Le preocupa que su familia tenga acceso a los opioides/narcóticos? La exposición a fármacos a menudo comienza en casa

Todas las personas experimentan el dolor de manera diferente, así que asegúrese de hablar con su médico sobre un plan de manejo del dolor que sea adecuado para usted.

Indicación

El EXPAREL® (suspensión inyectable de liposomas de bupivacaína) está indicado para la infiltración de dosis única en pacientes a partir de los 6 años de edad para hacer una analgesia local posquirúrgica y en adultos como bloqueo del nervio interescalénico del plexo braquial para hacer una analgesia regional posquirúrgica. No se ha establecido la seguridad ni la eficacia en otros bloqueos nerviosos.

Información importante de seguridad

EXPAREL no debe utilizarse en la anestesia de bloqueo paracervical obstétrico.

En estudios en adultos en los que se inyectó EXPAREL en la herida, los efectos secundarios más frecuentes fueron náuseas, estreñimiento y vómitos.

Consulte la Información de la prescripción completa que se adjunta.

Para obtener más información, visite www.EXPAREL.com/patient o llame al 1-855-793-9727.

EXPRESA SUS INQUIETUDES

Deseo evitar tomar opioides/narcóticos.

Los opioides pueden causar somnolencia o confusión, estreñimiento y náuseas, y es posible que necesite dosis más altas con el tiempo. Además, los opioides pueden llegar a ser adictivos o pueden ser usados indebidamente por otras personas.

Me preocupan los efectos secundarios de la anestesia o los analgésicos.

Informe a su médico sobre cualquier efecto secundario que haya tenido en el pasado.


Quiero volver a la vida normal pronto.

Los efectos secundarios de algunos analgésicos podrían hacer que su recuperación sea más larga de lo que usted espera.

NON-OPIOID
EXPAREL®
(bupivacaine liposome injectable suspension)

PREGUNTE SOBRE LOS OPIOIDES

“¿Hay opciones
no opioides para
mi cirugía?”



LA RESPUESTA: EXPAREL NO OPIOIDE PARA UN ALIVIO DURADERO DEL DOLOR

EXPAREL comienza a aliviar el dolor durante la cirugía y, a la vez, reduce la necesidad de opioides

- Se requiere solo 1 dosis, administrada por su médico, por lo que tiene 1 cosa menos que controlar
- Proporciona control del dolor durante los primeros días después de la cirugía, cuando más lo necesita, adormeciendo el lugar donde se realizó la cirugía
- Funciona directamente en el lugar de la intervención quirúrgica, a diferencia de los opioides, que afectan a todo el cuerpo
- Reduce la necesidad de opioides tanto en adultos como en niños, como se demuestra en los ensayos clínicos*

*El beneficio clínico de la disminución del consumo de opioides no se demostró en los ensayos esenciales.

Información de seguridad importante (continuación)

En estudios en adultos en los que se inyectó EXPAREL cerca de un nervio, los efectos secundarios más comunes fueron náuseas, fiebre y estreñimiento.

En el estudio en el que se administró EXPAREL a niños, los efectos secundarios más comunes fueron náuseas, vómitos, estreñimiento, presión arterial baja, cantidad baja de glóbulos rojos, contracciones musculares, visión borrosa, picazón y latidos cardíacos rápidos.

EXPAREL puede causar una pérdida temporal de sensibilidad y/o pérdida de movimiento muscular. El nivel y la duración de la pérdida de sensibilidad y/o del movimiento muscular dependen de dónde y cuánto de EXPAREL se inyectó, y pueden durar hasta 5 días.


No se recomienda el uso de EXPAREL en pacientes menores de 6 años para la inyección en la herida, en pacientes menores de 18 años para la inyección cerca de un nervio y/o en embarazadas.

Consulte la Información de la prescripción completa que se adjunta.
Para obtener más información, visite www.EXPAREL.com/patient o llame al 1-855-793-9727.

NON-OPIOID
EXPAREL®
(bupivacaine liposome injectable suspension)

¿LE PREOCUPA TOMAR OPIOIDES?

**PREGUNTE SOBRE EXPAREL
SIN OPIOIDES**



LOS OPIOIDES PUEDEN NO SER LA MEJOR OPCIÓN PARA USTED DESPUÉS DE UNA CIRUGÍA

Los efectos secundarios de los opioides pueden retrasar su recuperación

- Los opioides pueden causar náuseas, vómitos y estreñimiento
- Los opioides pueden hacer que se sienta somnoliento o confundido

Los opioides pueden tener efectos a largo plazo, incluido el abuso y el uso a largo plazo

- Más de 50 millones de personas han notificado el uso de fármacos con receta por motivos no médicos al menos una vez
- 1 de cada 15 pacientes que tomaron un opioide después de una cirugía se convirtió en un usuario a largo plazo
 - Algunas personas desarrollan tolerancia y necesitan dosis más altas con el tiempo

**COMIENCE A HABLAR
CON SU MÉDICO SOBRE
SUS OPCIONES PARA
ALIVIAR EL DOLOR**

ESCANEE EL CÓDIGO



Información de seguridad importante (continuación)

Informe a su proveedor de atención médica si usted o su hijo tienen una enfermedad hepática, ya que esto puede afectar la forma en que el ingrediente activo (bupivacaína) en EXPAREL se elimina del cuerpo.

EXPAREL no debe inyectarse en la columna vertebral, las articulaciones ni las venas.

El ingrediente activo de EXPAREL puede afectar al sistema nervioso y al sistema cardiovascular; puede causar una reacción alérgica; puede causar daños si se inyecta en las articulaciones; y puede causar un trastorno raro de la sangre.

**Consulte la Información de la prescripción completa que se adjunta.
Para obtener más información, visite www.EXPAREL.com/patient o
llame al 1-855-793-9727.**

NON-OPIOID
EXPAREL®
(bupivacaine liposome injectable suspension)

PREGUNTE SOBRE LOS OPIOIDES

HAY UNA RESPUESTA

Indicación

El EXPAREL® (suspensión inyectable de liposomas de bupivacaína) está indicado para la infiltración de dosis única en pacientes a partir de los 6 años de edad para hacer una analgesia local posquirúrgica y en adultos como bloqueo del nervio interescalénico del plexo braquial para hacer una analgesia regional posquirúrgica. No se ha establecido la seguridad ni la eficacia en otros bloqueos nerviosos.

Información importante de seguridad

EXPAREL no debe utilizarse en la anestesia de bloqueo paracervical obstétrico.

En estudios en adultos en los que se inyectó EXPAREL en una herida, los efectos secundarios más comunes fueron náuseas, estreñimiento y vómitos.

En estudios en adultos en los que se inyectó EXPAREL cerca de un nervio, los efectos secundarios más comunes fueron náuseas, fiebre y estreñimiento.

En el estudio en el que se administró EXPAREL a niños, los efectos secundarios más comunes fueron náuseas, vómitos, estreñimiento, presión arterial baja, cantidad baja de glóbulos rojos, contracciones musculares, visión borrosa, picazón y latidos cardíacos rápidos.

EXPAREL puede causar una pérdida temporal de sensibilidad y/o pérdida de movimiento muscular. El nivel y la duración de la pérdida de sensibilidad y/o del movimiento muscular dependen de dónde y cuánto de EXPAREL se inyectó, y pueden durar hasta 5 días.

No se recomienda el uso de EXPAREL en pacientes menores de 6 años para la inyección en la herida, en pacientes menores de 18 años para la inyección cerca de un nervio y/o en embarazadas.

Informe a su proveedor de atención médica si usted o su hijo tienen una enfermedad hepática, ya que esto puede afectar la forma en que el ingrediente activo (bupivacaína) en EXPAREL se elimina del cuerpo.

EXPAREL no debe inyectarse en la columna vertebral, las articulaciones ni las venas.

El ingrediente activo de EXPAREL puede afectar al sistema nervioso y al sistema cardiovascular; puede causar una reacción alérgica; puede causar daños si se inyecta en las articulaciones; y puede causar un trastorno raro de la sangre.

Consulte la Información de la prescripción completa que se adjunta.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE www.EXPAREL.com/patient O LLAME AL 1-855-793-9727.

Se le recomienda que informe los efectos secundarios negativos de los fármacos con receta a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA).

Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.



©2022 Pacira Pharmaceuticals, Inc., una filial de total propiedad de
Pacira BioSciences, Inc. Todos los derechos reservados. PP-EX-US-7750 08/22

NON-OPIOID
EXPAREL®
(bupivacaine liposome injectable suspension)